

KANT 1

BELANGRIJK - WAARSCHUWINGSKAART
Abacavir/Lamivudine Teva 600/300 mg, filmomhulde tabletten
Draag deze kaart altijd bij u

Omdat Abacavir/Lamivudine Teva 600/300 mg abacavir bevat, kunnen sommige patiënten die Abacavir/Lamivudine Teva 600/300 mg gebruiken een overgevoeligheidsreactie (ernstige allergische reactie) ontwikkelen, die **levensbedreigend** kan zijn wanneer de behandeling met Abacavir/Lamivudine Teva 600/300 mg wordt voortgezet.

NEEM ONMIDDELIJK CONTACT OP MET UW ARTS voor advies over het al dan niet stoppen met Abacavir/Lamivudine Teva 600/300 mg als:

- 1) u huiduitslag krijgt OF
- 2) u één of meer symptomen krijgt van tenminste TWEE van de volgende groepen
 - koorts
 - kortademigheid, keelpijn of hoesten
 - misselijkheid of braken of diaree of buikpijn
 - ernstige vermoeidheid of pijn in het hele lichaam of een algemeen gevoel van ziek zijn

KANT 2

(zie ommezijde kaart)

Als u met het gebruik van Abacavir/Lamivudine Teva 600/300 mg gestopt bent als gevolg van deze reactie, **MAG U ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600/300 MG NOOIT MEER GEBRUIKEN**; hetzelfde geldt voor alle andere geneesmiddelen die abacavir (bijvoorbeeld Ziagen, Triumeq of Trizivir) bevatten. U kunt dan namelijk binnen een paar uur een levensbedreigende verlaging van uw bloeddruk krijgen of overlijden.

U moet onmiddellijk contact opnemen met uw arts als u denkt dat u een overgevoeligheidsreactie hebt op Abacavir/Lamivudine Teva 600/300 mg. Noteer de gegevens van uw arts hieronder:

Arts:..... Tel:.....

Als uw arts niet beschikbaar is, moet u dringend elders medisch advies vragen (bijvoorbeeld bij de Eerste Hulp afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis).

Voor algemene informatie over Abacavir/Lamivudine Teva 600/300 mg kunt u contact opnemen met Teva Nederland BV, tel:+31 (0) 800 0228400